

Inleiding: In deel 1 zagen we hoe een perfecte kuif moest zijn bij de Portugese harlekijn en hoe anders hij was bij een gloster kanarie.

Welk ras ook, een goede kuif kweken is geen sinecure! In dit artikel wil ik het hebben over de kweek van glosters met extra aandacht voor hun kuif.

Om een goed kweekkoppel samen te stellen gaat er veel aan vooraf: DNA en kweeklijn van de ouders en grootouders; vorm van de schedel; middelpunt van de kuif; gevederte...

We weten allen dat je steeds moet kiezen voor een combinatie kuif x gladkop (of omgekeerd). Dan mag je in het nest ongeveer 50% kuif (corona) en 50% gladkop (consort) jongen verwachten.

Mijn eigen ervaring is dat ik elk jaar meer mannen dan poppen kweek. Maar ook meer gladkop vogels dan kuiven. En de ene kuif is beter dan de andere. Het kweken van tentoonstelling waardige vogels met nog een mooie kuif erop is dus niet voor de hand liggend.

Nu kan je denken dat een makkelijke manier om veel kuiven te kweken is door gewoon kuif x kuif te koppelen? Opgepast: dit heeft twee hele grote nadelen.

Het eerste nadeel is dat er bij de koppeling kuif x kuif een lethaalfactor optreedt waardoor sommige jongen weinig overlevingskansen hebben of in het ei afsterven. Een tweede nadeel is dat de kuifactor verkleinend werkt. Maar is dat zo?

Hoe begint dit verhaal? Mijn poppen en mannen zitten een lange periode van elkaar gescheiden in aparte lokalen. Lekker rustig zonder elkaar te storen. Naar het kweekseizoen toe creëer ik op die manier de mogelijkheid om de mannen enkele weken vroeger extra licht te geven dan de poppen. Dit kweekseizoen was het niet anders.

Tenminste dat dacht ik...

Wat dit jaar wel uitzonderlijk was? Toevallig of niet maar al mijn mannen hadden een kuif; alle poppen waren gladkop. Tenminste dat dacht ik...

Wanneer ik de vogels in de kweekruimte wilde zetten merkte ik dat er toch een pop tussen de mannen was gesukkeld. Vermits die pop samen met de mannen extra licht had gehad was ze heel broedrijp! En het was verdorie nog een mooie pop ook. Maar ik had dus geen enkele man gladkop! Twee collega's gebeld: jammer, ze konden me op dat moment niet helpen.

Zou ik dan maar mijn reserve kuifman gebruiken? Dan krijg je toch de lethaalfactor? Tegen alle wetenschap en verhalen in wilde ik zelf de proef op de som nemen. Welke combinatie maakte ik dus? Kuif x corona of moet ik zeggen corona x kuif...

Foto: Kuif van de gebruikte kweekman



F10

Foto van de pop: om de jongen beter te kunnen voederen is haar kuif bij de ogen bijgeknipt



F11



F12

De kweekresultaten:

Eerste ronde:

4 eitjes; alle 4 bevrucht; alle 4 geboren; 1x corona en 3x consort

De corona heeft een redelijke kuif; de consort vogels hebben een wat te smal hoofd



F13

Tweede ronde:

5 eitjes; 1x onbevruucht; 2x jong afgestorven in het ei; 2x jong met kuif geboren maar een slechte kuif.



F14



F15

Derde ronde:

5 eitjes: 5 bevrucht; alle 5 geboren; 2x consort jong en 3x corona jongen; 1 consort jong is de tweede dag gestorven zonder merkbare oorzaak; van de 3 corona jongen hebben er twee een slechte kuif; de derde kuif is redelijk.



F16

Conclusie: toch wel probleempjes in de kweek. De jongen die overleven zijn mooie gezonde vogels maar duidelijk mindere kwaliteit. Vooral de kuiven zijn niet goed en ook merkbaar kleiner. Voor tentoonstelling of kweek niet geschikt. En de combinatie kuif x kuif? Laat dat nu een overeenkomst zijn tussen de Portugese harlekijn & glosters: Niet doen!

Nota: gladkop x gladkop geeft wel betere resultaten maar er worden geen kuiven geboren!